

from the students of Pamukkale University Medical School. The Empathic Skill Scale and Attitudes towards Communication in Medical Practice Questionnaire were used to collect data from 108 students (52.8% female, 47.2% male). Furthermore, to determine the sociodemographic characteristics of the students an information form was used. **Results:** Attitudes towards Communication in Medical Practice point averages of the students were found 33.26 ± 4.55

(range: 18-40). Empathic skill point averages of the students were found 129.76 ± 36.09 (range: 17-187). **Conclusion:** Medical school students perceive the importance of communication skills and empathic tendencies. In the light of results, improving communication skills program is required.

Key words: empathy, communication, medicine, education

Kaynaklar/References

1. Dereboy Ç, Harlak H, Gürel S, Gemalmaz A, Eskin M. *Tıp eğitiminde eşduyumu öğretmek*. Türk Psikiyatri Dergisi 2005; 16:83-89.
2. Dökmen Ü. *Iletişim Çalışmaları ve Empati*. İstanbul, Sistem Yayıncılık, 1994.
3. Akvardar Y, Ünal B, Günay T, Kırın S, Bozabali Ö, Demiral Y. *Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi* 2002; 16: 167-172.

Anatolian Journal of Psychiatry 2009; 10(Suppl.1):S61

S62 Poster bildiriler / Poster presentations

Bir genel psikiyatri polikliniğinde erişkin DEHB tanısıyla izlenen hastaların değerlendirilmesi / Evaluation of patients with adult ADHD in a general psychiatry polyclinic

Cem ŞENGÜL, Muharrem EFE, Hüseyin ALAŞAM, Hasan HERKEN, Pamukkale Üniversitesi, Denizli
E-mail: acemsen@hotmail.com

Giriş: Erişkin dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu (DEHB) konusunda yapılan çalışmalar, hastalığın daha iyi anlaşılmamasının yolunu açmış ve hastalık genel psikiyatri polikliniklerinde daha iyi tanıınmaya başlamıştır.^{1,2} Ayrıca özelleşmiş erişkin DEHB poliklinikleri sayesinde hastalığın izlenmesinde daha iyi sonuçlar elde edilebilmektedir. Biz 2008 yılında hastanemiz polikliniğine başvuran ve erişkin DEHB tanısı konan hastaların verilerini geriye dönük olarak incelemeyi amaçladık. **Yöntem:** Çalışmada 2008 yılında üniversitemiz genel psikiyatri polikliniğinde erişkin DEHB tanısı konularak izlem altına alınan hastaların verilerini geriye dönük olarak incelemeyi planladık. **Bulgular:** 2008 yılı poliklinik kayıtlarına göre toplam 39 hasta erişkin DEHB tanısı ile izlenmekteydi. Bu hastalardan 23'ü (%59) erkek, 16'sı (%41) kadındı. Hastaların yaş ortalaması 27.8 ± 12.0 idi ve 16-68 yaş

arasında değişmekteydi. Hastaları yaşlarına göre gruplara ayırdığımızda, hastaların 26'sı (%61.5) 16-25, 6'sı (%15.4) 26-35, altısı (%15.4) 36-45 yaş grubundaydı ve üçü (%7.7) 45 yaşından büyüktü. Bu 39 hastanın dokuzundan (%23.1) erişkin DEHB'na depresyon, üçüne (%7.7) ise anksiyete bozukluğu tanısı eşlik etmekteydi. Hastaların %92.3'ü antidepressan ilaçlar kullanmaktadır. İki hasta ilaçsız izlenirken, bir hasta sadece modafinil ile izlenmekteydi. **Tartışma:** DEHB'ye yönelik sorgulamanın özellikle polikliniğe unutkanlık, konsantrasyon sorunları ve dürtüselliğ gibi yakınmalarla başlayan hastalarda yapılması ve mümkünse bu hastaların özelleşmiş polikliniklerde izlenmesi, bozukluğun daha iyi tanıınmasının ve tedavi edilmesinin yolunu açacaktır.

Anahtar sözcükler: Psikiyatri, DEHB, tedavi

Evaluation of patients with adult ADHD in a general psychiatry polyclinic

Objective: Studies on adult attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) made the disease more clear and disorder was understood better in ambulatory psychiatry.^{1,2} In addition, better results were achieved on Adult ADHD treatment in specialized ADHD polyclinics. We investigated our polyclinic data for Adult ADHD retrospectively for year 2008. **Methods:** We aimed to

investigate 2008 polyclinics data of patients with Adult ADHD retrospectively. **Results:** Thirty-nine patients were diagnosed as adult ADHD in 2008. Twenty-three (%59) of these patients were male and 16 (%41) were female. Mean age of patients 27.8 ± 12.0 and ranges from 16 to 68. When we categorized patients for their age; 26 patients (%61.5) were between 16-25 years,

six patients (%15.4) were 26-35 years, six patients (%15.4) were 36-45 years and three (%7.7) were above 45 years. Nine patients (%23.1) had comorbid depression and three (%7.7) patients had comorbid anxiety disorders. Most of the patients (%92.3) were using antidepressants for treatment. Two patients were not using any drug and only one patient used modafinile for treatment. **Discussion:**

Kaynaklar/References

1. Adler LA. *Epidemiology, impairments, and differential diagnosis in adult ADHD: introduction.* CNS Spectr 2008; 13:4-5.
2. Spencer TJ. *The epidemiology of adult ADHD.* CNS Spectr 2008; 13:6-8.

Sizofreni ve şizoaffektif bozukluk tanılı hastalarda sertindol kullanımı: Bir olgu serisi / Sertindole usage in schizophrenia and schizoaffective disorder: a case series

Cem ŞENGÜL,¹ Ceyhan BALCI ŞENGÜL,²

¹ Pamukkale Üniversitesi, Denizli, ² Devlet Hastanesi, Denizli,

E-mails: acemsen@hotmail.com, melikeceyhan@gmail.com

Giriş: Sertindol şizofreni ve şizoaffektif bozukluk tedavisinde etkili, ekstrapiramidal yan etkiler açısından tipik antipsikotiklere üstün bir ajandır. İlaç 1998 yılında kardiyak yan etkileri nedeniyle piyasadan çekilmiş, 2002 yılında üretici firma tarafından güvenliğini gösteren çalışmaların yapılmasıyla yeniden kullanıma girmiştir.^{1,2} Bu sunumda ülkemizde son 1.5 yıldır bulunan sertindol ile ilgili verilerimizi ve deneyimlerimizi sunmayı amaçladık. **Yöntem:** Sertindol başladığımız hastaların dosyalarını geriye dönük inceledik. **Bulgular:** Çalışmada en uzunu 14 ay, en kısası 1.5 ay sertindol kullanan DSM-IV tanı ölçütlerine göre 11'ine şizofreni, 6'sına şizoaffektif bozukluk tanısı konmuş 17 hastayı inceledik. Bu hastalardan 12'si erkek, beşi kadındı. Üç hastanın başlangıç Klinik Global İzlem (KGİ)

puanı yedi, sekiz hastanın altı ve altı hastanın beşti. Hastaların tamamı aynı süre sertindol kullanmamakla birlikte, tedavi sonrasında hiçbir hasta KGİ skorundan yedi veya altı almadı. Hastalardan ikisinin KGİ puanı beş, altısının dört, ikisinin üç, üçünün iki ve dördünün birdi. Gözlenen başlıca yan etkiler uykusuzluk, bulantı ve baş ağrısıydı. Hastalarda QTc aralığı 500 ms üzerinde olan hasta olmadı. **Sonuç:** Avrupa'da yaygın olarak kullanılmakla birlikte, ülkemizde görece yeni bir ajan olan sertindol şizofreni ve şizoaffektif bozukluk tedavisinde iyi bir tedavi seçeneği olabilir.

Anahtar sözcükler: Şizofreni, sertindol, şizoaffektif bozukluk

Sertindole usage in schizophrenia and schizoaffective disorder: a case series

Objective: Sertindole, an effective agent in treatment of schizophrenia and schizoaffective disorder, was superior to typical antipsychotics in extra pyramidal system side effects. Drug was withdrawn from market for cardiologic side effects at 1998, but reintroduced after completion of studies showing its safety in 2002.^{1,2} We aimed to present our experience and data on sertindole which was available for last 1.5 years.

Methods: We investigated the files of patients whom were using sertindole for treatment retrospectively. **Results:** We investigated 17 patients (11 with schizophrenia and 6 with schizoaffective disorder) whom were using sertindole for treatment for 1.5 months to 14 months. Twelve of these patients were male and five were female. Three of patients had a CGI score of seven, eight of them had six, and six of them