

Epilepsi hastalarının kişilik özelliklerinin Cloninger'in Mizaç ve Karakter Ölçeği ile değerlendirilmesi

B Bostancı, N Konuk, S Kıran, Z Kökre, SN Yeni
Elbistan Devlet Hastanesi, Kahramanmaraş

Amaç: Epilepsi hastalarının kişilik yapısını boyutsal olarak değerlendiren az sayıda araştırma vardır. Bu çalışma-da epilepsi hastalarının kişilik özelliklerinin, kişiliği boyutsal açıdan değerlendirmeye olanak tanıyan Mizaç ve Karakter Ölçeği (MKÖ) kullanılarak sağlıklı kontrollere göre farklılık olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. **Yöntem:** Bu araştırma, 78 epilepsi hastası ve 85 sağlıklı kontrol grubu üzerinde yürütülen kesitsel, karşılaştırmalı bir araştırmadır. Denekler SCID-I, SCID-II, MKÖ ve HAM-D ölçekleri ile değerlendirildi. Gruplar arasında fark olup olmadığı, parametrik koşullarda t testi ve nonparametrik koşullarda Mann-Whitney U testi ile analiz edildi. **Bulgular:** Epilepsi grubu ile kontrol grubu arasında (s=85) MKÖ alt ölçekleri bakımından; zarardan kaçınma, yabancı-lardan çekinme, sebat etme, amaçlılık, beceriklilik, kendini aşma, kendilik kaybı, kişiler ötesi özdeşim ve manevi kabullenme skorlarında anlamlı farklılık bulundu ($p<0.005$). Buna göre epilepsi hastaları kontrollere göre karam-sar, sakıngan, utangaç, bitkin, tembel, elde ettiğiyle yetinen, faydacı, amaçlı, beceriksiz, hayal gücü kıt, aşırı denetimli, materyalistik ve paylaşımcı olmayan bireyler olarak tanımlanabilir. Epilepsi grubunda %23 oranında I. eksen tanısı saptandı. En sık saptanan bozukluk majör depresyondur (s=10, %56). Aynı grupta %37 (s=29) sıklıkla saptanan DSM-IV II. eksen kişilik bozukluklarının %59'unu (s=17) C kümesi kişilik bozuklukları oluşturmak-taydı. **Tartışma:** Araştırmamızın sonucunda epilepsi hastalarının kontrollere göre MKÖ parametreleri açısından farklılıklar gösterdiği ortaya konmuştur. Bu farklılıkların epilepsi hastalığıyla nedensel ilişkisini saptamaya yönelik daha büyük hasta serilerinde yapılacak izlem çalışmalarına gereksinim vardır.

The evaluation of personality of epileptic patients by using Cloninger's Temperament and Character Inventory

Objective: There is little research evaluating the personality of epileptic patients dimensionally in the literature. In this study we aimed to evaluate the personality traits of epileptic patients and compare them healthy controls by using Cloningers Temperament and Character Inventory (TCI). **Methods:** Seventy-eight consecutive epileptic outpatients and 85 healthy controls were included. Both groups were given TCI after evaluation by SCID I, SCID II and HAM-D. The data were analyzed with regard the group differences with t test (parametric condition) or Mann-Whitney U tests by using computer program. **Results:** The epileptic group were found significantly different ($p<0.005$) regarding TCI parameters; shyness, harm avoidance, persistence, self-forgetfulness, transpersonal identification, spiritual acceptance and self-transcendence. Accordingly, epileptic patients can be defined as pessimistic, fearful, shy, fatigable, lazy, underachiever, pragmatist, unimaginative, controlling, materialistic and possessive individuals compared to the control group. 23% of the epileptic group has had at least one DSM Axis I disorder. The most common diagnose was depression (n=10, 56%). Detected 37% (n=29) DSM-IV Axis II diag-nosis of which 59% (n=17) consisted of cluster C personality disorders within the same group. **Discussion:** Our results showed that epileptic patients were differentiated with regard the TCI parameters compared to the healthy controls. Our results indicate that epileptics are more fearful, impersistent (easily discouraged) and concrete (lower in ST, less insightful and intuitive). To find out causal relationship between these differentiation and epilep-sy, follow up studies in a larger sample are needed.