

Ası ile intihar girişimi sonrası gelişen ikincil demans olgusu: Bir yıllık izleme

S Zincir, C Çelik, A Balıkçı, Ö Uzun

GATA, Ankara

Ası, intihar girişim yöntemleri arasında ölüm olasılığı en yüksek olan yöntemlerdendir. Ölümle sonuçlanmayan ası girişimlerinde morbidite ağır seyretmektedir. Ası sonucu karotis ve vertebral arterlerin akut oklüzyonu nedeniyle serebral kan akımı kesintiye uğramakta, beyin parankiminin oksijen ve glikoz desteğinin azalması ile hipoksik ensefalopati gelişmektedir. Hipoksinin süresine ve etkilenen beyin bölgelerine göre başta bilişsel bozulmalar olmak üzere çeşitli psikiyatrik belirtiler ortaya çıkmaktadır. Bu yazıda ası ile intihar girişimi sonrasında bilişsel alan-da bozukluk gelişen ve sekizinci aya kadar anormal beyin görüntüleme bulgusu vermeyen bir olgu tartışılmıştır.

Secondary dementia case following suicide attempted by hanging: a follow-up for one [year]

Hanging is one of the methods that have the highest mortality rate among other suicide attempts. In the unsuccessful hanging attempts morbidity is usually severe. As a result of hanging, the cerebral blood flow is interrupted due to the acute occlusion of the vertebral arteries and, hypoxic encephalopathy develops due to the reduction in oxygen and glucose support of the brain parenchyma. Several psychiatric signs, primarily cognitive disorders, reveal with respect to the time of hypoxia and to the affected brain regions. In this article, we aimed to discuss a case with defect in the cognitive area have been developed after a suicide attempt by hanging and who did not abnormal brain imaging findings until the eighth [month].