

Complicaciones del tratamiento en la enfermedad de Parkinson. Conclusiones globales

Gurutz Linazasoro-Cristóbal

Policlínica Gipuzkoa.
San Sebastián, Guipúzcoa, España.

Correspondencia:

Dr. Gurutz Linazasoro Cristóbal.
Centro de Investigación Parkinson.
Fundación Doctor Carlos Elósegui.
Policlínica Gipuzkoa. Parque
Miramón, 174. E-20011 San
Sebastián (Guipúzcoa).

E-mail:

glinazasoro@terra.es

Aceptado:

18.01.10.

Cómo citar este artículo:

Linazasoro-Cristóbal G.
Complicaciones del tratamiento
en la enfermedad de Parkinson.
Conclusiones globales. Rev Neurol
2010; 50 (Supl 4): S54.

© 2010 Revista de Neurología

Muchos de los problemas que surgen a lo largo de la evolución de la enfermedad de Parkinson (EP) condicionan la calidad de vida y determinan el pronóstico de la EP. Además, son problemas de elevada prevalencia. Por este motivo, debe hacerse un esfuerzo especial para prevenir aquellas complicaciones que puedan prevenirse.

En la fisiopatología de la mayoría de estas complicaciones, concurren dos factores:

- Progresión de la enfermedad sobre la vía nigroestriatal y sobre otros sistemas del núcleo talámico.
- Tratamiento dopaminérgico (pulsatilidad y/o acción selectiva sobre algún subtipo de receptor).

Recientes estudios apuntan a la relevancia de otros factores, como la edad, el sexo o la genética. Por esto, pueden compartir ciertos aspectos de su fisiopatología.

El siguiente esquema resume la situación de algunos de los puntos clave en el manejo de los problemas tratados.

- *Discinesias*: ajuste de terapia, estimulación dopaminérgica continua/estimulación cerebral profunda, nuevos fármacos.
- *Demencia*: como en la enfermedad de Alzheimer, con mejor respuesta.
- *Depresión*: tratamiento convencional.
- *Hipersomnolencia*: mejora del sueño, evitación de inductores, estimulación.
- *Trastorno del control de impulsos*: suspensión de los dopaminérgicos (D_3), neurolépticos atípicos, estimulación dopaminérgica continua.
- *Alucinaciones/psicosis*: eliminación de las causas, suspensión de antiparkinsonianos, neurolépticos atípicos.
- *Síntomas no motores*: ajuste de tratamiento (*offu on*), tratamiento sintomático.